

GEBRAUCHSINFORMATION

Nobilis Paramyxo P201

Paramyxovirose (PPMV-1) Impfstoff, inaktiviert, für Tauben

Emulsion zur Injektion

Zusammensetzung

1 Dosis (0,25 ml) enthält:

Pigeon Paramyxo Virus-1 (PPMV-1) Antigen, Stamm P201, inaktiviert

$\geq 6,8 \log_2 \text{HAH}^*$ und $\leq 10,2 \log_2 \text{HAH}^*$ Einheiten beim Huhn

Dünnflüssiges Paraffin

138 mg

* Hämagglutinationshemmung

Anwendungsgebiete

Zur aktiven Immunisierung von Tauben, um die durch eine virulente PPMV-1 Infektion hervorgerufenen klinischen Symptome zu verringern. Die Impfung führte zu einer signifikanten Reduktion der Virusausscheidung nach einer Belastungsinfektion. Eine belastbare Immunität entsteht 4 Wochen nach der ersten Impfung. Eine Immunitätsdauer von einem Jahr ist nachgewiesen.

Gegenanzeigen

Nur gesunde Tiere impfen

Nebenwirkungen

Nach der Impfung wurden keine klinischen Reaktionen beobachtet

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Es liegen keine Informationen zur Sicherheit und Wirksamkeit der gleichzeitigen Anwendung dieses Impfstoffs mit einem anderen vor. Deshalb wird empfohlen, innerhalb von 14 Tagen vor oder nach der Impfung mit diesem Produkt keine anderen Impfstoffe anzuwenden.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Impfstoff vor Gebrauch auf +15 °C bis +25 °C erwärmen und gut schütteln. Sterile Spritzen und Nadeln verwenden

Jedem Tier sollten 0,25 ml des Impfstoffes subkutan in das untere Nackendrittel appliziert werden.

Die Tauben können ab einem Lebensalter von 5 Wochen geimpft werden.

Jährliche Wiederholungsimpfungen werden empfohlen.

Wartezeit

Null Tage

Warnhinweise

Für den Anwender:

Dieses Produkt enthält Mineralöl. Eine versehentliche Injektion/Selbstinjektion kann zu starken Schmerzen und Schwellungen führen, insbesondere bei einer Injektion in ein Gelenk oder einen Finger, und kann in sehr seltenen Fällen zum Verlust des betroffenen Fingers führen, wenn er nicht umgehend ärztlich behandelt wird.

Wird das Produkt versehentlich injiziert, ziehen Sie sofort einen Arzt zu Rate, selbst wenn nur eine kleine Menge injiziert wurde, und nehmen Sie die Packungsbeilage mit.

Halten die Schmerzen nach der ärztlichen Untersuchung länger als 12 Stunden an, ziehen Sie erneut einen Arzt zu Rate.

Für den Arzt:

Dieses Produkt enthält Mineralöl. Selbst wenn nur geringe Mengen injiziert wurden, kann eine versehentliche Injektion dieses Produkts starke Schwellungen verursachen, die beispielsweise zu ischämischen Nekrosen und sogar dem Verlust eines Fingers führen kann.

Eine UMGEHENDE, fachkundige chirurgische Behandlung ist erforderlich, die eine frühzeitige Inzision und Spülung des Bereichs, in dem die Injektion vorgenommen wurde, erfordern kann, insbesondere wenn Fingerkuppen oder Sehnen betroffen sind.

Aufbewahrungshinweise

Bei +2 °C bis +8 °C aufbewahren Vor Frost schützen
Impfstoff für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Impfstoffes

Nach Anbruch: unmittelbar aufbrauchen

Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, daß kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

Zur Beachtung

Vor Gebrauch dieses Produktes sollte die nationale und europäische Gesetzgebung zu PMV-1 Infektionen (PPMV-1, Newcastle Disease usw.) beachtet werden, da die Impfung bestimmter Taubenrassen in einigen Ländern verboten sein könnte.

Nicht mit einem anderen Impfstoff oder immunologischen Produkt mischen.

Verschreibungspflichtig

Handelsformen

Mehrdosenbehältnisse zu 20, 50 oder 250 ml

Datum der Fassung der Packungsbeilage

Oktober 2002

Intervet Deutschland GmbH

Postfach 1130

D-85701 Unterschleißheim

