

GEBRAUCHSINFORMATION

Prevaccinol[®]

Rhinopneumonitis- Lebendimpfstoff (gefriergetrocknet) für Pferde

Zur intramuskulären Injektion

Zusammensetzung

1 Dosis des rekonstituierten Impfstoffes (5 ml) enthält:

equines Herpesvirus Typ 1 (EHV1), Stamm RAC-H, lebend, attenuiert,

mind. 10^6 , max. $10^{7,7}$ GKID₅₀ *

Spuren von Neomycin

Lösungsmittel enthält: Phosphatpuffer

Anwendungsgebiete

Zur aktiven Immunisierung von Pferden, um Infektionen mit dem equinen Herpesvirus Typ 1 (EHV-1) zu verringern und die klinischen Symptome der durch dieses Virus verursachten respiratorischen Erkrankung zu vermindern.

Spezifische Anwendung

Wird der Impfstoff wie empfohlen angewendet, induziert er Komplement-bindende (CF) und Virus-neutralisierende (VN) Antikörper, die zu einer signifikanten Verringerung der Virämiehäufigkeit, der Dauer und Höhe der Virusausscheidung, der Körpertemperaturanstiege sowie der klinischen Symptome der Rhinopneumonitis führen, wie in einem Challenge-Versuch mit einem pathogenen EHV-1 Stamm gezeigt wurde.

Eine Immunität wird innerhalb von 2 - 4 Wochen nach der Grundimmunisierung erreicht.

Wiederholungsimpfungen in 6-Monats-Intervallen führen zur Erhaltung der aktiven Immunität.

Gegenanzeigen

Impfung von kranken und interkurrent erkrankten Pferden sowie von Pferden mit starkem Parasitenbefall oder schlechtem Allgemeinzustand sind zu vermeiden. Stuten dürfen nach dem 9. Monat der Trächtigkeit nicht mehr geimpft werden.

Nebenwirkungen

Keine bekannt

* Gewebekultur-infektiöse Dosis 50 %

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Es liegen keine Erkenntnisse zur Sicherheit und Wirksamkeit dieses Produktes bei gleichzeitiger Anwendung anderer Impfstoffe vor. Es wird daher empfohlen, im Zeitraum von 14 Tagen vor und nach der Impfung mit diesem Produkt keine anderen Impfstoffe anzuwenden.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Zur intramuskulären Injektion bei Pferden.

Vor Gebrauch ist der Impfstoff mit dem gesamten Inhalt des mitgelieferten Lösungsmittelfläschchens zu resuspendieren.

Grundimmunisierung:

2 Impfungen mit je einer Dosis (5 ml) im Abstand von 3 - 4 Monaten frühestens ab dem 6. Lebensmonat.

Wiederholungsimpfungen

Alle 6 Monate.

Wartezeit

Null Tage

Warnhinweise

Um den durch die Impfung induzierten Schutz zu optimieren, müssen folgende Anforderungen erfüllt sein:

- regelmäßige Impfung des gesamten Bestandes
- Vermeidung des Transfers nicht-immunisierter oder kranker Tiere in vorschriftsmäßig immunisierte Bestände

Aufbewahrungshinweise

Lagerung bei +2 °C bis +8 °C, geschützt vor Frost. Behältnis im Umkarton aufbewahren.

Impfstoff für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Impfstoffes

Der resuspendierte Impfstoff muss sofort verwendet werden.

Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Lebendimpfstoff! Angebrochene und leere Flaschen sowie alle verwendeten Utensilien sind sofort zu desinfizieren und anschließend zu sterilisieren bzw. entsprechend den geltenden Vorschriften unschädlich zu beseitigen.

Zur Beachtung

1. Der Impfstoff kann während der Trächtigkeit jedoch nur bis zum Beginn des 10. Monats sowie während der Laktation angewendet werden.
 2. Nicht mit anderen Impfstoffen / immunologischen Produkten außer dem mitgelieferten Lösungsmittel mischen.
-

Verschreibungspflichtig

Handelsformen

Packung mit 2 x 1 Impfdosis

Datum der Fassung der Packungsbeilage

April 2003

Intervet Deutschland GmbH
Postfach 1130
D-85701 Unterschleißheim

