

Gebrauchsinformation: Information für die Anwenderin/den Anwender

NeisVac-C

Suspension zur Injektion in einer Fertigspritze ohne Kanüle
Adsorbierter Meningokokken-Gruppe C-Polysaccharid-Konjugatimpfstoff

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie diesen Impfstoff erhalten.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist NeisVac-C und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von NeisVac-C beachten?
3. Wie ist NeisVac-C anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist NeisVac-C aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST NeisVac-C UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

NeisVac-C gehört zu einer Gruppe von Arzneimitteln, die Impfstoffe genannt und eingesetzt werden, um vor Infektionskrankheiten zu schützen. NeisVac-C dient zur Vorbeugung einer Erkrankung, die durch eine Gruppe von Bakterien verursacht werden, die *Neisseria meningitidis* der Gruppe C genannt werden.

Neisseria meningitidis der Gruppe C können schwere Infektionen wie Gehirnhautentzündung und Blutvergiftung verursachen. Diese Krankheiten können manchmal lebensbedrohlich sein.

Dieser Impfstoff bewirkt lediglich einen Schutz gegen die Krankheit, die durch Meningokokken der Gruppe C verursacht wird und schützt Sie nicht vor Erkrankungen durch andere Meningokokken oder Erregern, die ebenfalls Gehirnhautentzündung und Blutvergiftung verursachen. Wie andere Impfstoffe kann NeisVac-C nicht alle Impfungen vollständig vor Meningokokken Gruppe-C-Infektionen schützen.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON NeisVac-C BEACHTEN?

NeisVac-C darf nicht angewendet werden

- Wenn Sie jemals eine allergische Reaktion auf eine frühere Impfdosis oder einen der Inhaltsstoffe hatten. Diese Symptome schließen allergische Reaktionen wie Hautrötung, Anschwellen von Gesicht und Kehle, Atembeschwerden, Blaufärbung von Zunge oder Lippen, niedrigen Blutdruck und Kollaps mit ein.
- Wenn Sie jemals eine allergische Reaktion auf einen andere Meningokokken-C-Impfstoff hatten. Die Impfung sollte nicht vorgenommen werden, wenn Sie eine infektiöse Erkrankung (z. B. erhöhte Temperatur, Halsschmerzen, Husten, Erkältung oder Grippe) haben. In diesem Fall wird Ihr Arzt Ihnen möglicherweise raten, die Impfung auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, wenn Sie sich wieder besser fühlen.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von NeisVac-C ist erforderlich

- wenn Sie Hämophilie-Patient sind oder eine andere Erkrankung haben, die Ihr Blut am Gerinnen hindert
- wenn bekannt ist, dass Sie an einer Autoimmunerkrankung leiden oder wenn Sie aus anderen Gründen ein schwaches Immunsystem haben, zum Beispiel:
 - Ist bekannt, dass Sie nicht gut Antikörper bilden können?
 - Nehmen Sie Arzneimittel ein, die Ihre Immunität gegen Infektionen reduzieren (wie Krebsmedikamente oder hohe Dosen an Kortikosteroiden)?
- wenn Ihnen die Milz entfernt wurde, oder wenn bekannt ist, dass Ihre Milz nicht richtig arbeitet
- wenn Sie an einer Nierenerkrankung leiden, bei der große Mengen an Eiweiß in Ihrem Urin auftreten (genannt Nephrotisches Syndrom).
Es gibt Berichte, dass dieser Zustand nach der Impfung erneut auftreten kann. Ihr Arzt wird Sie beraten, ob Sie dennoch mit NeisVac-C geimpft werden können. Sein Rat wird von der Art Ihrer Nierenerkrankung abhängen.
- wenn Sie über 65 Jahre alt sind.

In diesen Fällen befragen Sie Ihren Arzt, bevor Sie diesen Impfstoff erhalten. Er könnte für Sie nicht gut verträglich sein. Sie können möglicherweise dennoch mit diesem Impfstoff geimpft werden, aber

Sie werden vielleicht keinen hohen Impfschutz gegen Infektionen mit Bakterien der Gruppe C aufbauen.

Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol Natrium (22 Milligramm) pro Dosis, ist also praktisch „natriumfrei“.

Bei Anwendung von NeisVac-C mit anderen Arzneimitteln

Ihr Arzt wird Sie darüber beraten, ob NeisVac-C bei Ihnen gleichzeitig mit anderen injizierbaren Impfstoffen verabreicht werden kann.

NeisVac-C kann gleichzeitig mit Impfstoffen gegen

- Kinderlähmung
- Masern-Mumps-Röteln
- Diphtherie-Tetanus-Keuchhusten
- Infektionen verursacht durch *Haemophilus influenzae* (Hib)
- Pneumokokken-Infektionen

verabreicht werden, sollte dann aber als Einzelinjektion an einer anderen Körperstelle gegeben werden.

NeisVac-C kann bei Säuglingen zeitgleich mit anderen Impfstoffen, die gegen Hepatitis B-Infektionen schützen, verabreicht werden. Ihr Arzt wird Sie beraten, ob dies nötig und welcher Impfstoff gegebenenfalls verträglich ist.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich dabei um nicht-verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Informieren Sie Ihren Arzt vor der Impfung:

- wenn Sie schwanger sind, oder planen schwanger zu werden
- wenn Sie stillen.

NeisVac-C kann Ihnen von Ihrem Arzt bei einem hohen Infektionsrisiko dennoch verabreicht werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es ist unwahrscheinlich, dass der Impfstoff die Verkehrstüchtigkeit einer Person oder deren Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt.

3. WIE IST NeisVac-C ANZUWENDEN?

1 Dosis von NeisVac-C beträgt 0,5 ml (ein halber Milliliter, eine sehr kleine Flüssigkeitsmenge)

NeisVac-C wird in einen Muskel injiziert. Normalerweise wird es bei Säuglingen in den Oberschenkel und bei älteren Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in den Oberarm gegeben.

Der Impfstoff darf nicht unter die Haut oder in ein Blutgefäß injiziert werden und Ihr Arzt oder das Krankenpflegepersonal wird dies bei der Verabreichung sorgfältig beachten.

Säuglingen zwischen 2 und 12 Monaten sollten 2 Dosen im Abstand von mindestens 2 Monaten erhalten.

Nach der Grundimmunisierung mit 2 Dosen sollte Säuglingen eine Auffrischimpfung verabreicht werden. Diese wird die Schutzwirkung verstärken. Ihr Arzt wird Sie darüber beraten, wann Ihr Kind diese Auffrischung erhalten sollte.

Für Kinder älter als 12 Monate, Jugendliche und Erwachsene wird eine Einzeldosis des Impfstoffs (0,5 ml) empfohlen.

Wenn Sie eine größere Menge von NeisVac-C erhalten haben, als Sie sollten

Es gibt keine Erfahrungen hinsichtlich einer Überdosierung von NeisVac-C. Eine Überdosierung ist zudem höchst unwahrscheinlich, da der Impfstoff als Einzeldosis abgefüllt in einer Fertigspritze vorliegt und vom Arzt verabreicht wird.

Wenn Sie eine Dosis von NeisVac-C versäumt haben oder die Grundimmunisierung abgebrochen wurde

Ihr Arzt wird Sie über die Impfabfolge informieren. Wenn Sie eine Impfung versäumt haben oder die Grundimmunisierung abgebrochen wurde, kann dies eine unzureichende Schutzwirkung zur Folge haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Impfstoffes haben, fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann NeisVac-C Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der angeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

Wie bei allen injizierbaren Impfstoffen können allergische Reaktionen auftreten. Obwohl diese sehr selten sind, können diese Reaktionen schwerwiegend sein. Um darauf vorbereitet zu sein, sollten

wirksame medizinische Behandlungsmaßnahmen und eine Überwachung für eine angemessene Zeit nach der Impfung zur Verfügung stehen.

Anzeichen und Symptome von schweren allergischen Reaktionen können sein:

- Anschwellen von Lippen, Mund und Kehle, was Schluckbeschwerden oder Atemnot verursachen kann
- Rötungen und Schwellungen von Händen, Füßen und Gelenken
- Bewusstseinsverlust durch Blutdruckabfall

Diese Anzeichen treten normalerweise schnell nach Verabreichung der Injektion auf, während sich der Patient noch in der Klinik oder in der Praxis aufhält. Sollten solche Anzeichen nach Verlassen dieser Einrichtungen auftreten, müssen Sie UNVERZÜGLICH einen Arzt aufsuchen.

Es wurde über die folgenden Nebenwirkungen berichtet:

Sehr häufige Nebenwirkungen (treten bei mehr als 1 von 10 Personen auf)

- *In allen Altersgruppen*
 - Rötungen, Schwellungen, Berührungsempfindlichkeit und Schmerzen an der Injektionsstelle
 - Kopfschmerzen
- *Bei Säuglingen und/oder Kleinkindern*
 - Appetitverlust
 - Krankheitsgefühl
 - Durchfall
 - Schreianfälle
 - Reizbarkeit
 - Schläfrigkeit
 - Müdigkeit
 - schlechter Schlaf
- *Bei älteren Kindern*
 - Schmerzen in Armen und Beinen

Häufige Nebenwirkungen (treten bei weniger als 1 von 10 Personen auf)

- *In allen Altersgruppen*
 - Fieber
- *Bei Kindern*
 - Appetitverlust
 - Krankheitsgefühl
 - Durchfall
 - Schmerzen in Armen und Beinen
- *Bei Erwachsenen und älteren Kindern*
 - Muskelschmerzen

Es wurde auch über die folgenden Nebenwirkungen berichtet:

- Hautausschläge, die sich über den ganzen Körper ausbreiten und zu Blasenbildung und Abschälungen führen. Es können auch die Mundschleimhaut und die Augen betroffen sein.
- Juckreiz
- Nesselsucht
- andere Ausschläge
- geschwollene Lymphknoten
- Schwindel
- Ohnmacht
- Missempfindungen oder reduzierte Empfindungen
- Verlust des Muskeltonus oder Schlaffheit bei Säuglingen
- purpurfarbene Punkte oder Flecken unter der Haut, die durch den Abfall bestimmter Blutzellen, die für die Blutstillung verantwortlich sind, verursacht werden. Das kann wie Blutergüsse aussehen.
- Anfälle (Krämpfe). Diese schließen Berichte von Patienten mit ein, die schon gelegentlich an Anfällen gelitten haben. Bei Jugendlichen und Erwachsenen können die Krämpfe in einigen dieser Berichte sogar Ohnmachtsanfälle gewesen sein. Bei Säuglingen und Kleinkindern treten Anfälle normalerweise bei Fieber auf und stellen wahrscheinlich Fieberkrämpfe dar. Die meisten Patienten erholen sich rasch von diesen Anfällen.

Wenn Sie von Ihrem Arzt darüber informiert wurden, dass Sie an einem Nephrotischen Syndrom leiden, kann es vorkommen, dass innerhalb weniger Monate nach der Impfung ein Rückfall dieser Krankheit bei Ihnen auftritt. Das Nephrotische Syndrom ist eine Nierenerkrankung, die mit Schwellungen, besonders an den Augen und im Gesicht, mit Eiweiß im Urin, der aufschäumt, und/oder Gewichtsverlust auftritt. Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie nach der Impfung ähnliche Beschwerden feststellen.

Wenn eine dieser Nebenwirkungen andauert oder schwerwiegend wird, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Bei sehr kleinen Frühgeborenen (d. h. in oder vor der 28. Schwangerschaftswoche geboren) können innerhalb von 2-3 Tagen nach der Impfung längere Atemaussetzer auftreten.

Dieser Impfstoff kann keine Meningokokken-C-Erkrankung verursachen. Wenn Sie oder Ihr Kind eine der folgenden Anzeichen einer Meningokokken-Infektion bemerken wie:

- Nackenschmerzen
 - Nackensteifigkeit
 - Lichtempfindlichkeit (Photophobie)
 - Schläfrigkeit
 - Verwirrtheit
 - rote oder purpurne, bluterguss-ähnliche Flecken, die unter Druck nicht verblassen
- sollten Sie sofort einen Arzt aufsuchen oder Kontakt mit Ihrer örtlichen Unfall- oder Notfalleinrichtung aufnehmen.

5. WIE IST NeisVac-C AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Sie dürfen NeisVac-C nach dem auf der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Das Arzneimittel im Kühlschrank bei 2°C-8°C lagern. Nicht einfrieren. Die Spritze in der Faltschachtel aufbewahren.

Innerhalb der Laufzeit kann das Produkt einmalig bis zu 9 Monate lang bei Raumtemperatur (max. +25°C) aufbewahrt werden. Der Beginn des Lagerungszeitraums und das korrigierte Verfalldatum müssen auf der Produktverpackung vermerkt werden. Das korrigierte Verfalldatum für die Lagerung bei Raumtemperatur darf die reguläre Haltbarkeitsdauer von 42 Monaten nicht überschreiten. Am Ende der Raumtemperaturlagerung muss das Produkt verbraucht oder verworfen werden.

Das Arzneimittel darf nicht mit dem Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was NeisVac-C enthält

Der Wirkstoff von NeisVac-C in einer Impfdosis (0,5 ml) enthält:

Neisseria Meningitidis Serogruppe C (Stamm C11)	
Polysaccharid (de-O-acetyliert)	10 µg
gebunden an Tetanustoxoid	10 bis 20 µg
adsorbiert an hydratisiertes Aluminiumhydroxid	0,5 mg Al ³⁺

Die sonstigen Bestandteile sind Natriumchlorid und Wasser für Injektionszwecke

Wie NeisVac-C aussieht und Inhalt der Packung

NeisVac-C ist eine leicht trübe, weiße, dünnflüssige Suspension zur Injektion. Während der Lagerung können ein weißer Niederschlag und ein klarer Überstand auftreten. Daher muss der Impfstoff vor Gebrauch geschüttelt werden, um eine gleichmäßige Verteilung zu erreichen. Sollten in der Spritze Fremdpartikel auftreten, muss der Impfstoff vom Fachpersonal verworfen werden.

NeisVac-C ist als Suspension zur Injektion in einer Fertigspritze (als Einzeldosis von 0,5 Milliliter) abgefüllt. Es sind Packungen zu 1, 10 und 20 Spritzen verfügbar. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht. Die Einzelpackung enthält zwei Nadeln unterschiedlicher Größe. Es wird empfohlen die kleinere Nadel zur Injektion für Kinder zu benutzen und die größere Nadel bei Erwachsenen einzusetzen. Die Primärverpackung ist latexfrei.

Inhaber der Zulassung

Einfuhr, Umpackung und Vertrieb

EurimPharm Arzneimittel GmbH
83451 Piding

Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:

Österreich	NeisVac-C
Belgien	NeisVac-C
Bulgarien	NeisVac-C

Zypern	NeisVac-C
Tschechien	NeisVac-C
Dänemark	NeisVac-C
Estland	NeisVac-C
Finnland	NeisVac-C
Frankreich	NeisVac-C
Deutschland	NeisVac-C
Griechenland	NeisVac-C
Ungarn	NeisVac-C
Island	NeisVac-C
Irland	NeisVac-C
Italien	NeisVac-C
Lettland	NeisVac-C
Litauen	NeisVac-C
Luxemburg	NeisVac-C
Malta	NeisVac-C
Niederlande	NeisVac-C
Norwegen	NeisVac-C
Polen	NeisVac-C
Portugal	NeisVac-C
Rumänien	NeisVac-C
Slowakei	NeisVac-C
Slowenien	NeisVac-C
Spanien	NeisVac-C
Schweden	NeisVac-C
Großbritannien	NeisVac-C

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt in Januar 2010.

Für weitere Informationen nehmen Sie bitte Kontakt mit dem örtlichen Vertreter des Zulassungsinhabers auf.

Diese Packung wurde von der EurimPharm Arzneimittel GmbH,
83451 Piding importiert. Der Beipackzettel wurde ebenfalls von der
EurimPharm Arzneimittel GmbH gedruckt und hinzugefügt.
